

INFORMACIÓN GENERAL

CINNA-MEC es un complejo insecticida, acaricida a base del streptomyces avermitilis potencializado con Aldehído Cinámico que controla los estados móviles de los ácaros y estados larvales de los minadores de hoja, se usa según las indicaciones y en los cultivos autorizados.

CINNA-MEC inmoviliza las plagas poco después de la exposición. La mortalidad máxima se alcanza entre los 3 y 7 días, durante este periodo la alimentación y daños son mínimos.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Aguacate	Araña roja	25 a 100 ml por cada 100 L de agua	Se recomienda hacer 2 aplicaciones. En temporadas de lluvia la aplicación del producto debe ser dirigida al envés de las hojas para un mejor control de la plaga.
Arándano, fresa, frambuesa, zarzamora, mora azul y uva.	Araña roja, Araña ciclamina.	250 a 500 ml 50 ml/100 L de agua	Iniciar aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la plaga.
Calabaza, brócoli, melón, papaya y pepino.	Minador de la hoja.	250 a 500 ml	Se recomienda hacer 2 aplicaciones. La segunda aplicación a los 7 días.
Cebolla, chile, jitomate, papa, papaya.	Minador de la hoja. Araña roja.	250 a 500 ml	Se recomienda hacer 2 aplicaciones. Inicie cuando se presenten los primeros adultos, con un intervalo de aplicación de 7 días.
Cítricos	Negrilla de los cítricos. Araña roja.	250 a 750 ml	Realice 2 aplicaciones a intervalos de 7 días.
Granos	Araña roja	250 a 500 ml	Se recomienda hacer 2 aplicaciones. La segunda aplicación a los 7 días.
Pimiento	Minador de la hoja. Ácaro blanco.	250 a 500 ml	Se recomienda hacer 2 aplicaciones. La segunda aplicación a los 7 días.

CONSIDERACIONES EN SU USO

Calibre el equipo de aplicación. Agítese fuertemente antes de abrir. Abra el envase, verifique que el sello de seguridad no esté alterado, proceda a quitarlo. Agregar al tanque de aspersión un cuarto de agua, disuelva la dosis indicada y agregue el resto del agua, agite constantemente la mezcla y durante la aspersión.

APLICACIÓN: CINNA-MEC puede ser utilizado para tratamientos preventivos y/o curativos. La temperatura, los diferentes valores de pH y la dureza del agua, normalmente encontradas en condiciones agrícolas, NO AFECTAN EL DESARROLLO DE CINNA-MEC. Mantenga la mezcla en agitación una vez que se prepare con agua. La mezcla debe ser aplicada el mismo día. Evite utilizarla de un día para otro.

CONTRAINDICACIONES

No aplique CINNA-MEC cuando la velocidad del viento sea alta y/o cuando haya alta temperatura.

INCOMPATIBILIDAD

CINNA-MEC es compatible con los agroquímicos de uso común, sin embargo se recomienda efectuar una pequeña prueba de compatibilidad, antes de proceder a su mezcla con otros materiales. No mezclar con productos que no tengan registro ni en cultivos no autorizados.

Cinna-mec®

INSECTICIDA - ACARICIDA

INSECTICIDA - ACARICIDA

ESPECIFICACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO	%P/V
Abamectina (Avermectina)	3.60%
80% de avermectina B1a y 20% de avermectina B1b	
Aldehído Cinámico	30.00%
Vehículo, emulsificantes, antioxidante y ajustador de pH. No más de:	66.40 %
TOTAL	100.00%

PRESENTACIÓN

250 ml, 1 L.

Porque con  **AgroScience® siempre cosechas mayores ganancias!**

