

INFORMACIÓN GENERAL

ROOT-FACTOR es un complejo líquido a base de fitohormonas, aminoácidos y ácidos orgánicos, además de un alto contenido en fósforo cuya función es inducir la formación y multiplicación de raíces y estimular su crecimiento, proporcionando a las plantas una mayor capacidad de abastecerse de los nutrientes necesarios, dando como resultado un cultivo más vigoroso.

ROOT-FACTOR actúa directamente al entrar en contacto con la raíz, estimulando así la emisión de nuevos brotes en la zona radicular. Se potencializa si su aplicación se complementa con PUSH.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
FRUTALES: CÍTRICOS, MANGO, AGUACATE, MANZANO, DURAZNO, PAPAYO, NOGAL, VID, PLÁTANO.	500 ml - 1L	Aplicar al suelo en la línea de la copa del árbol, o bien en media luna para el caso del plátano, repetir cada 15 días.
GRAMINEAS: MAÍZ, TRIGO, CEBADA, SORGO. LEGUMINOSAS: FRIJOL, SOYA, GARBANZO, HABA, ETC.	500 ml - 1L	Aplicar en el inicio del cultivo en el primer riego de auxilio o iniciado el temporal directamente sobre suelo mojado. Repetir a los 21 días.
HORTALIZAS: TOMATES, CHILES, CEBOLLAS, PEPINOS, SANDÍAS, MELONES, CALABACITAS.	500 ml - 1L	Dirigir la aplicación a la base de la planta a los 5 a 8 días después del trasplante, repetir a los 15 días, pueden continuarse hasta inicio a floración semanal o quincenalmente.
HORTALIZAS EN CHAROLA: TOMATE, LECHUGA, BRÓCOLI, COL, CEBOLLA, ESPÁRRAGOS, MELÓN, CALABACITAS, ESPINACAS, PEPINO, SANDÍA Y ZANAHORIA.	0.5 - 1 ml / L de agua de riego	Aplicar mezclando 3.5 ml de PUSH mas 0.5 ml de Root-Factor por L de agua de riego en plantas con 8 días de brotadas, a los 5 ó 7 días posteriores aplicar 7 ml de PUSH mas 1 ml de Root-Factor por L de agua de riego, inmediatamente aplicado el producto lavar el follaje con un riego limpio y el doble volumen de agua, para que éste llegue a la zona de las raíces. No realizar inmersiones.
FRUTILLAS: ARÁNDANO, FRESA, FRAMBUESA, ZARZAMORA.	500 ml - 1L	Dirigir la aplicación a la base de la planta a los 5 a 8 días después del trasplante, repetir cada 8 días, pueden continuarse hasta inicio a floración semanal o quincenalmente.
CAÑA DE AZÚCAR	1L	Aplicar al momento de la siembra asperjando directamente la semilla antes de tapar y/o después del primer riego al momento inmediato en que pueda accederse, dirigiendo el chorro a la base de la planta sin usar boquillas.
PAPA	1L	Aplicar al momento de la siembra asperjando directamente la semilla antes de tapar y repetir cada semana hasta completar 4 aplicaciones. Deben de ser durante los 30 días iniciales para generar la mayor cantidad de tubérculos y tener el tiempo para llenarlos perfectamente, de preferencia acompañarlo con el paquete AgroScience para etapa de arranque.
ORNAMENTALES	250 - 500 ml	Dirigir la aplicación a la base de la planta a los 5 a 8 días después del trasplante, repetir a los 15 días, pueden continuarse hasta inicio a floración semanal o quincenalmente.

CONTRAINDICACIONES: Dado que se realizará una estimulación, es necesario contar con la humedad adecuada en el suelo y los nutrientes involucrados en la estimulación. Se recomienda complementar con PUSH conservando la relación por cada litro de ROOT-FACTOR, 10 a 20 litros de PUSH. No aplicar más de las dosis que aquí se recomiendan, es preferible fraccionar dosis.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Disolver los mililitros requeridos de ROOT-FACTOR en el agua que se va a aplicar por hectárea.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de reacción alcalina, es recomendable realizar una pequeña prueba de compatibilidad.

CONSIDERACIONES EN SU USO

Dado que se realizará una estimulación, es necesario contar con la humedad adecuada en el suelo y los nutrientes involucrados en la estimulación. Se recomienda complementar con PUSH conservando la relación por cada litro de ROOT-FACTOR, 10 a 20 litros de PUSH, No aplicar más de las dosis que aquí se recomiendan, es preferible fraccionar dosis.

CONTRAINDICACIONES

No exceder las dosis que aquí se recomiendan por hectárea. Aplicar en época de lluvias al pie de la planta o en el agua de riego, haciendo llegar el producto a la zona de raíces. En el caso de aplicar en riegos de aspersión, continuar regando para lavar el producto de las hojas y que éste llegue a zona de raíces.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de reacción alcalina, es recomendable realizar una pequeña prueba de compatibilidad.

Root-Factor
PROMOTOR DEL DESARROLLO RADICULAR
ENRAIZADOR

¡Atrévete a comparar!
ESPECIFICACIÓN

ANÁLISIS GARANTIZADO	%P/V
Auxinas	2 000 ppm
Citocininas	600 ppm
Giberelinas	500 ppm
Aminoácidos	10.00%
Fósforo P	15.00%
Elementos relacionados	74.34%
TOTAL	100.00%

PRESENTACIÓN

250 ml, 1, 5, 10 y 20 L.

Porque con AgroScience® siempre cosechas mayores ganancias!
